

Studienübersicht



Stand: 01.07.2016

Entität	Kurzbeschreibung	Studiename (Kürzel)		Studiename (Langversion)	Hauptprüfer	Status (offen, geschlossen, abgeschlossen)
CLL	Ibrutinib vs. Placebo; Pat. in Binet Stadium A mit "intermediate, high oder very high" Risiko für frühen Progress	CLL-12	III	A placebo-controlled, double-blind, randomized, multicenter, three arm phase III trial to compare the efficacy and safety of Ibrutinib vs. placebo in previously untreated Binet stage A CLL patients with risk of early disease progression EudraCT Nr. 2013-003211-22 Universität zu Köln	Dr. Bernd Lathan	offen
CLL	MEDI 551 + Bendam. vs. Rituximab + Bendam. nur bei Progr. nach ≥ 1 Zyklus Rituximab; prospektiv	MEDI 551-1019	II	A phase 2 open-label study of MEDI 551 and Bendamustine vs Rituximab and Bendamustin in adults with relapsed or refractory CLL EudraCT Nr. 2011-002566-21 MedImmune	Dr. Clemens Schulte	geschl.
CLL		CLL-NIS	NIS	Rituximab in der Therapie der Chronischen Lymphatischen Leukämie ML22610 Roche Pharma AG	Dr. Jörg Lipke	geschl.
CLL	Erst- oder Zweitlinientherapie, retrospektiv (kein LyFit und LyNut mehr), max. 4 Wo. nach Therapiebeginn	Tumorreg. Lymphat. Neoplasien	Reg.	IOMEDICO AG	Dr. Jörg Lipke	geschl.
CLL	Patienten mit gesicherter CLL, alle Krankheitsphasen (ausgen. Hirnmetastasen)	CLL-Reg.	Reg.	Langzeit-Nachbeobachtung von Patienten mit CLL, B-PLL, T-PLL, SLL, T/NK-LGL und Richter Transformation Register der Deutschen CLL_Studiengruppe (DCLLSG) Köln Universität zu Köln	Dr. Clemens Schulte	offen

CML (1st line)	Tasigna prospektiv, zw. Erstdiagn. u. Einschluss max. 28 Tage	MOMENT II	NIS	Eine prospektive nicht-interventionelle Studie bei Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase unter Nilotinib-Therapie: Molekulares Monitoring, prospektive Pharmakoökonomie, Patientenzufriedenheit Arbeitskreis Klinische Studien	Dr. Bernd Lathan	offen
CML (2nd or further line)	Tasigna retrospektiv, max. 12 Mon. nach Therapiebeginn	TARGET	NIS	Nicht-interventionelle Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Tasigna (Nilotinib) sowie zur Therapietreue der Patienten in der Behandlung der Philadelphia-Chromosom-positiven chronischen myeloischen Leukämie in chronischer Phase bei Patienten mit Resistenz oder Unverträglichkeit gegenüber einer vorherigen Behandlung inklusive Glivec Novartis Pharma GmbH	Dr. Clemens Schulte	offen
Follikuläre/ andere niedrig maligne und Mantelzell- Lymphome	Bendamustin /Rituximab Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zur Therapieoptimierung (Primärtherapie)	MAINTAIN	III	Prospective randomized multicenter study in first-line treatment of advanced progredient follicular and other indolent and mantle cell lymphomas EudraCT 2008-005859-16 Studiengruppe indolente Lymphome Universität Gießen	Dr. Bernd Lathan	geschl., außer für Morbus Waldenström
Follikuläres Lymphom CD 20-positiv	MabThera Erhaltungstherapie nach CR od. PR durch MabThera-Induktionstherapie	RIM	NIS	Rituximab in maintenance ML 22283 Roche Pharma AG	Dr. Jörg Lipke	geschl.
Immunglobulinmangel	Anwendung von Privigen® gem. Fachinformation, retrospektiv bis 1.1.2015	PRIVIGEN	NIS	Anwendung von Privigen®: Eine nicht interventionelle Beobachtungsstudie IgPro10_5001 CSL Behring	Dr. Bernd Lathan	offen
Immunthrombozytopenie	Anwendung von Revolade® bei Patienten mit primärer cITP	RISA	NIS	Revolade® in patients with chronic Immune thrombocytopenia (cITP) - an observational study of the TPO receptor agonist Eltrombopag in daily practice Novartis Pharma GmbH	Dr. Bernd Lathan	offen

Kolorektales Karzinom	Pat. ≥ 70 J., keine vorherige Chemo- oder Radiotherapie, Anschluss an PETACC prospektiv, innerh. 2 Wo. vor Therapiebeginn (Studie in Zusammenarbeit mit St. Josefs Hospital)	AMOTE-I	NIS	Use of a pretherapeutic and postoperative assessment in elderly patients with colorectal cancer and decision making process regarding participation in clinical trials - motivation of members of the study team and patients KKS Halle	Dr. Christian Teschendorf	offen
Kolorektales Karzinom, metastasiert od. lokal fortgeschritten	Einschluss vor 1. oder 2. pall. Linie, Versand Tumorblock oder liquid biopsy für Markeranalytik	GO-KOLORAS	Reg.	Therapieverhalten und gesundheitsökonomische Therapiekosten von Patienten mit metast. Kolorektalem Karzinom bei Behandlungen in onkologischen Vertragsarztpraxen unter alltäglichen Behandlungsbedingungen German Oncology GmbH	Dr. Clemens Schulte	offen
Kolorektales Karzinom, metastasiert	Avastin + Flourpyrimidin-basierte Chemotherapie first-line retrospektiv, max. 3. Mon. nach Therapiebeginn	KORALLE	NIS	Avastin first-line beim metastasierten kolorektalen Karzinom Roche Pharma AG	Dr. Jörg Lipke	offen
Kolorektales Karzinom, metastasiert	Capecitabin/FUFA + Bevacizumab vs. Capecitabin/FUFA + Irinotecan + Bevacizumab prospektiv	ML 22011	III	Sequenzielle Erstlinientherapie des metastaiserten kolorektalen Karzinoms mit Capecitabin/FUFA, Irinotecan und Bevacizumab - Capecitabin/FUFA plus Bevacizumab versus Capecitabin/FUFA plus Irinotecan plus Bevacizumab als Erstlinientherapie beim metastasierten kolorektalem Karzinom EudraCT Nr. 2009-013099-38 AIO-Studien-gGmbH	Dr. Christian Teschendorf	geschl. 01.04.2016
Kolorektales Karzinom	Neurotoxizität unter Oxaliplatin (Omnicare) , adj. oder pall., max 14 T. retrospektiv	NEMO	NIS	Nicht-interventionelle Studie zur Erfassung der Neurotoxizität unter adjuvanter oder palliativer Therapie mit Oxaliplatin Omnicare bei Pat. mit kolorektalem Karzinom Omnicare Pharma GmbH	Dr. Clemens Schulte	offen

Kolorektales Karzinom, metastasiert, RAS-Wildtyp	1st line-Therapie mit mFOLFOX6 + Panitumumab , Maintenance mit 5-FUFA + Panitumumab vs. 5-FUFA , Reinduktion mit mFOLFOX6 + Panitumumab vs. mFOLFOX6	PANAMA	II	Randomized Phase II study for evaluation of efficacy and safety of maintenance treatment with 5-FU/FA plus panitumumab vs. 5-FU/FA alone after prior induction treatment with mFOLFOX6 plus panitumumab and re-induction with mFOLFOX6 plus panitumumab in case of progression for first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer. EudraCT Nr. 2012-005422-30 AIO-Studien-gGmbH	Dr. Jörg Lipke	offen
Kolorektales Karzinom lokal fortgeschr.	Capecitabin, Oxaliplatin nicht-metastasierte Pat; prospektiv (Studie in Zusammenarbeit mit St. Josefs Hospital)	PETACC	III	Preoperative chemoradiotherapy and postoperative chemotherapy with Capecitabine and oxaliplatin vs. Capecitabine alone in locally advanced rectal cancer EudraCT-Nr. 2006-006532-21 EORTC	Dr. Christian Teschendorf	geschl.
Kolorektales Karzinom	(Studie in Zusammenarbeit mit St. Josefs Hospital)	SYNCHRONOUS	III	Resection of the primary tumor versus no resection prior to systemic therapy in patients with colon cancer and synchronous unresectable metastases (UICC stage IV) - A randomized controlled multicenter trial KKS Heidelberg	Dr. Selami Usta	offen
Kolorektales Karzinom	MGN1703 Erstlinientherapie metastasiert; partielle bzw. komplette Remission	IMPALA	III	Evaluation of an immunomodulatory maintenance treatment in patients with metastatic colorectal cancer with tumor reduction during induction treatment EudraCT-Nr. 2014-000834-50 MOLOGEN AG	Dr. Jörg Lipke	offen
Rektum-Karzinom	Validierungsstudie (Zusammenarbeit mit Knappschaftskhs.)	TRANS-VALID-A		Translationale Validierungsstudie zur Prüfung der KFO179-1 Biomarker Scores zur Preädiktion und Prognose fortgeschrittener, primär resektabler Rektumkarzinome der klinischen © Tumorstadien cUICC-II bis c-UICC-IV, die mit einer 5-FU basierten Standard-Radiochemotherapie gefolgt von einer totalen mesorektalen Exzision (TME) behandelt werden TransValid-KFO179/GRCSG-A Universität Göttingen und GRSCG	Prof. Dr. Karl-Heinz Bauer	geschl.

Kolorektales Karzinom		Tumorregister Kolorektales Karzinom	Reg.	IOMEDICO AG	Dr.Bernd Lathan	offen
Lungen-karzinom		Tumorregister Lungenkarzinom	Reg.	IOMEDICO AG	Dr. Clemens Schulte	geschl.
Lymphatische Neoplasien		Tumorregister Lymphatische Neoplasien	Reg.	IOMEDICO AG	Dr. Jörg Lipke	geschl.
Magen-Ca lokal fortgeschr., resektabel	5-FU, Leucovorin, Oxaliplatin, Docetaxel (FLOT) vs. Epirubicin, Cisplatin, 5-FU (ECF) prospektiv, neoadjuvante Chemotherapie, OP, adj. Chemotherapie (Studie in Zusammenarbeit mit St. Josefs Hospital)	FLOT4	III	Multizentrische, randomisierte Phase II/III Studie mit 5-FU, Leucovorin, Oxaliplatin und Docetaxel (FLOT) versus Epirubicin, Cisplatin und 5-FU (ECF) bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem, resektablem Adenokarzinomdes ösophagogastralen Überganges des Magens EuraCT Nr. 2010-018754-13 AIO	Dr. Christian Teschendorf	geschl. 05.01.2015
Magen-Ca. ösophago- gastraler Übergang, lokal fortgeschr.	FLOT vs. FLOT/ Herceptin/ Pertuzumab randomisiert, offen neoadjuvante Chemotherapie, OP, adj. Chemotherapie (Studie in Zusammenarbeit mit St. Josefs Hospital)	PETRARCA	II/III	FLOT vs. FLOT/ Herceptin/ Pertuzumab for perioperative therapy of locally advanced esophagogastric adenocarcinoma expressing HER2, a phase II/III trial of the AIO EuraCT Nr. 2014-002695-86 AIO	Dr. Christian Teschendorf	offen
Magen-Ca. molekular- genetische Untersuchung	Molekulargenetische Untersuchung (Studie in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Fridrich-Wilhelms- Universität Bonn)		DFG-Projekt	Molekulargenetische Untersuchungen zur Indikation von ursächlichen Genen für das Magenkarzinom Ethikvotum vom 29.01.2013 DFG- Projekt	Dr. Johannes Schumacher	offen

Mamma-Ca. ER+, lokal fortgeschr. od. metastasiert	Faslodex oder Exemestan 1st bis 3rd-Line, prospektiv	ACT-FASTER	NIS	An epidemiological prospective cohort study to describe treatment patterns of Fulvestrant and Exemestane in postmenopausal patients with advanced HR+ breast cancer under real-life conditions in Germany NIS-ODE-FAS-2009/1 Astra Zeneca GmbH	Sandra Ketzler-Henkel	geschl.
Mamma-Ca, metastasiert	Abraxane® prospektiv	NABUCCO	NIS	Nichtinterventionelle Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Nab-Paclitaxel (Abraxane®) bei Patienten mit metastasiertem Mammakarzinom IOMEDICO AG	Sandra Ketzler-Henkel	offen Zentrum ab- gemeldet
Mamma-Ca.	Palliative Erstlinientherapie endokrin oder CTX), retrospektiv, max. 4 Wo. nach Therapiebeginn oder (neo)adjuvante Therapie	Tumorreg. Mammakarzinom	Reg.	IOMEDICO AG	Sandra Ketzler-Henkel	offen
Mamma-Ca. metastasiert od.lokal fortgeschr.; HER2-pos.	Pertuzumab + Trastuzumab + Vinorelbin Pertuzumab + Trastuzumab getrennt oder in 1 Beutel, first-line; prospektiv	VELVET	II	A two-cohort, open-label phase II trial assessing the efficacy and safety of pertuzumab given in combination with tratsuzumab and vinorelbine in first line patients with HER2-positive advanced (metastatic or locally advanced) breast cancer EudraCT 2011-003308-18 F. Hoffmann-La Roche LTD	Dr. Clemens Schulte	abgeschl.
Mamma-Ca. nicht metastasiert	Paclitaxel + Lapatinib + Trastuzumab prospektiv, 3 Zyklen Induktionstherapie mit P+L+T, Biopsie, 9 weitere Zyklen, OP, Nachbehandlung (Studie in Zusammenarbeit mit Knappschaftskhs.)	Neo-PREDICT-HER2	II	A multicenter site, open label, phase II-trial to validate predictive markers for the response evaluation of a combined chemo-immunotherapy in patients with HER-2-positive early breast cancer EidraCT 2012-003679-21 WSG - Westdeutsche Studiengruppe GmbH	Dr. Markus Skrobol	geschl. 31.10.2015

MDS	Exjade® prospektiv	CONIFER	NIS	Nicht-interventionelle Studie zur Beurteilung des Therapiemonitorings während der Exjade-Behandlung der Eisentoxizität von MDS-Patienten mit transfusionsbedingter Eisenüberladung im Verlauf Novartis Pharma GmbH	Dr. Clemens Schulte	abgeschl.
MDS	retrospektiv (bis zu 3 Jahren nach Diagnosestellung möglich, wenn Krankheitsverlauf bekannt)	MDS-Register	Reg.	IOMEDICO AG	Dr. Bernd Lathan	offen
Multiples Myelom	Bortezomib, Lenalidomid Pad-Induktionstherapie vs. VCD-Induktionstherapie; Konsolidierung und Erhaltung mit Lenalidomid Pat. einschluss nur in Heidelberg	MM5	III	Randomisierte Phase III-Studie für Patienten mit unbehandeltem Multiplem Myelom zur Untersuchung zweier Therapieschemata einer Bortezomib-basierten Induktionstherapie und einer Lenalidomid-Konsolidierungstherapie gefolgt von einer Erhaltungstherapie mit Lenalidomid EudraCT Nr. 2010-019173-16 KKS Heidelberg und GMMG	Dr. Bernd Lathan	geschl.
Multiples Myelom rezidiert oder refraktär	Imnovid®(Pomalidomid + Dexamethason) prospektiv, mind. Drittlinientherapie, vorherige Therapien mit Lenalidomid und Bortezomib	POSEIDON	NIS	Nichtinterventionelle Studie zum Einsatz von Pomalidomid (Imnovid®) in Kombination mit Dexamethason zur Therapie des rezidierten oder refraktären Multiplen Myeloms IOMEDICO AG	Dr. Jörg Lipke	offen
Myelofibrose primär und sekundär	Jakavi® mind. 8 Wochen retrospektiv	JAKOMO	NIS	Eine prospektive zweiarmlige nicht-interventionelle Studie zur Jakavi®-Behandlung von Patienten mit Myelofibrose Novartis Pharma GmbH	Dr. Clemens Schulte	offen

Myelofibrose	Ruxolitinib vorbehandelte oder noch nicht behandelte Pat.; prospektiv	JUMP	IIIb	An open-label, multicenter, expanded access study of INC424 for patients with primary myelofibrosis (PMF) or post polycythemia myelofibrosis (PPV MF) or post-essential thrombocythemia myelofibrosis (PET-MF) EudraCT Nr. 2010-024473-39 Novartis Pharma GmbH	Dr. Sandra Ketzler-Henke	abgeschl.
NHL	Erst- oder Zweitlinientherapie, aggressives und indolentes NHL, retrospektiv, max. 4 Wo. nach Therapiebeginn	Tumorreg. Lymphat. Neoplasien	Reg.	s. CLL	Dr. Jörg Lipke	geschl.
MEDAC	Primärtherapie chemo-naiver Pat. ≥ 70 J. mit NSCLC IIIb od. IV; prospektiv	NSCLC-Reg.	Reg.	Registerstudie zur Erfassung der Versorgungssituation in Deutschland zur Primärtherapie älterer, chemo-naiver NSCLC-Patienten (≥ 70 Jahre) im fortgeschrittenen Stadium (IIIb oder IV) in der Klinik medac GmbH	Dr. Clemens Schulte	geschl.
NSCLC Stadium IIIB-IV	Selumetinib + Docetaxel vs. Placebo + Docetaxel KRAS+-Pat., prospektiv, 2nd line Therapie, doppelblind, randomisiert	SELECT-1	III	A phase III, double-blind, randomized, placebo-controlled study to assess the efficacy and safety of Selumetinib (AZD6244; ARRY-142886) (Hyd-Sulfate) in combination with Docetaxel, in patients receiving second line treatment for KRAS mutation-positive locally advanced or metastatic Non Small Cell Lung Cancer (Stage IIIB-IV) EudraCT 2013-001676-38 Astra Zeneca	Dr. Clemens Schulte	geschl.
NSCLC Stadium IIIB-IV	vorab ≥ 2 palliative Regime, davon 1 Platin-basiert; MEDI 4736 als palliative ≥ 3rd line, max. 12 Monate	ATLANTIC	II	A phase II, non-comparative, open label, multi-centre, international study of MEDI 4736, in patients with locally advanced or metastatic NSCLC (Stage IIIB-IV) who have received at least two prior systemic treatment regimens including one platinum-based chemotherapy regimen (ATLANTIC) EudraCT-Nr. 2013-005427-16 Astra Zeneca	Dr. Clemens Schulte	geschl.

NSCLC	Stadium IIIB-IV	Biomarker-Testung, Re-Testung, Therapieent-scheidungen und Outcome	CRISP	NIS	Clinical research platform into molecular testing, treatment and outcome of non-small cell lung carcinoma patients AIO-Studien-gGmbH	Dr. Bernd Lathan	offen
Diverse Entitäten	Exjade	Neueinstellung auf Eisenchalator; Behandlung seit max. 6 Monate; Neueunstellung auf Eisenchelator nach mind. 6 Mon. Pause	EXCALIBUR	NIS	Prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Eisenchelattherapie von Pat. mit chronischer Eisenüberladung Novartis Pharma GmbH	Dr. Sandra Ketzler-Henkel	offen
Diverse Entitäten	Exjade	prospektiv	EXSEPT	NIS	Nicht-interventionelle Studie zur Praktikabilität der Exjade-Behandlung von Patienten mit transfusionsbedingter Eisenüberladung Novartis Pharma GmbH	Dr. Clemens Schulte	geschl.
Diverse Entitäten	Filgrastim	Pat. mit potenzieller febriler Neutropenie durch CTX: prospektiv	MONITOR-GCSF	IV	Multi-level evaluation of chemotherapy-induced febrile neutropenia prophylaxis, outcomes, and determinants with granulocyte-colony stimulating factor EudraCT-Nr. 2009-01814520 Hexal AG	Dr. Jörg Lipke	geschl.
Diverse Entitäten	Lonquex®	Pat. mit chemotherapieinduzierten Neutropenien, max 14 T retrospektiv	NADIR	NIS	Nicht-interventionelle Studie zur Anwendung von Lipegfilgrastim (Lonquex®) bei chemotherapieinduzierten Neutropenien	Dr. Clemens Schulte	geschl.
Diverse Entitäten	Neurotoxizität unter Paclitaxel (Omnicare), max 14 T. retrospektiv		NEPAL	NIS	Nicht-interventionelle Studie zur Erfassung der Neurotoxizität unter adjuvanter oder palliativer Therapie mit Paclitaxel Omnicare bei Pat. mit versch. Tumorentitäten Omnicare Pharma GmbH	Dr. Bernd Lathan	offen
Diverse Entitäten	Neurotoxizität unter Docetaxel (Omnicare), max 14 T. retrospektiv		NORDIC	NIS	Nicht-interventionelle Studie zur Erfassung der Neurotoxizität unter adjuvanter oder palliativer Therapie mit Docetaxel Omnicare bei Pat. mit versch. Tumorentitäten Omnicare Pharma GmbH	Dr. Clemens Schulte	offen

Diverse Entitäten	Ratiograstim prospektiv; Pat. mit Neutropenie durch CTX	RATIOneu	NIS	Therapie mit Ratiograstim bei Patienten mit chemotherapie-induzierter Neutropenie ratiopharm GmbH	Dr. Clemens Schulte	geschl.
Diverse Entitäten	Rivaroxaban vs. Placebo bei Patienten mit solidem Tumor od. Lymphom und Khorana-Score ≥ 2 zur Prophylaxe von venösen Thromboembolien unter Chemotherapie	RIVACASSINI	III	Efficacy and Safety of Rivaroxaban Prophylaxis Compared with Placebo in Ambulatory Cancer Patients Initiating Systemic Cancer Therapy and at High Risk for Venous Thromboembolism EudraCT: 2015-001630-21 Janssen	Dr. Clemens Schulte	offen
Diverse Entitäten	Sancuso bei voraussichtl. mittelschwerer od. schwerer Übelkeit durch CTX	SANRED	Pat.-Befragung	Cancer Patients Initiating Systemic Cancer Therapy and at High Risk for Venous	Dr. Clemens Schulte	geschl.
Diverse Entitäten	Nivestim bei CTX-bedingter Neutropenie	VENICE	NIS	Thromboembolism	Dr. Clemens Schulte	geschl.
Diverse Entitäten	orale Therapie mit zytoreduktiven Medikamenten; Therapie muss mind. seit 14 Tagen laufen		Pat.-Befragung	Patientenkompetenz in der oralen Krebstherapie Projekt im Nationalen Krebsplan des BMG WINHO		geschl.